

## الفصل الرابع

### التصنيف الدوري للعناصر

#### I. مقدمة :

لاحظ العالم **Mandaleiv** في بحثه بان بعض العناصر لها خواص كيميائية متشابهة فقام سنة **1869** بوضعها و تصنيفها في جدول حسب تزايد العدد الكتلي **A** . بعد ذلك جاء العالم **Mosely** و أعاد ترتيب الجدول حسب تزايد العدد الذري **Z** و ذلك مع تزايد اكتشاف العناصر الكيميائية.

#### II. دراسة الجدول الدوري :

##### 1. دراسة الادوار :

<b>السطر الاول n=1</b> : يشمل العناصر التي تملئ فيها تحت الطبقة <b>1s</b> ( يحتوي على عنصرين )	
<b>السطر الثاني n=2</b> : يشمل العناصر التي تملئ فيها تحت الطبقة <b>2s,2p</b> ( يحتوي على 8 عناصر )	
<b>السطر الثالث n=3</b> : يشمل العناصر التي تملئ فيها تحت الطبقة <b>3s,3p</b> ( يحتوي على 8 عناصر )	
<b>السطر الرابع n=4</b> : يشمل العناصر التي تملئ فيها تحت الطبقة <b>4s,3d,4p</b> ( يحتوي على 18 عناصر )	
<b>السطر الخامس n=5</b> : يشمل العناصر التي تملئ فيها تحت الطبقة <b>5s,4d,5p</b> ( يحتوي على 18 عناصر )	
<b>السطر السادس n=6</b> : يشمل العناصر التي تملئ فيها تحت الطبقة <b>6s,4f,5d,6p</b> ( يحتوي على 32 عناصر )	
<b>السطر السابع n=7</b> : يشمل العناصر التي تملئ فيها تحت الطبقة <b>7s,5f,6d,7p</b> ( يحتوي على 32 عناصر )	

➤ آخر عنصر في الجدول الدوري هو **اونينوكتيوم Ununoctium** عدده الذري يساوي **118** وهو عبارة عن غاز خامل . وقد اكتشف سنة 2006 من طرف فريق من الباحثين أمريكيان و روس عن طريق تفاعل التحام بين عنصر **الكالسيوم 48** و عنصر **الكاليفورنيوم 249** :



➤ نحصل على عدد العناصر **x** في كل سطر بالعلاقة التالية :

حيث **n** رقم السطر

$x = \frac{1}{2}(n+1)^2$


✓ إذا كان رقم السطر فردي :

$x = \frac{1}{2}(n+2)^2$


✓ إذا كان رقم السطر زوجي :

➤ بعض العناصر تعتبر كشواذ لقاعدة **Klechkowski** حيث تحت الطبقة **d** و **f** تكون مستقرة عندما تكون مملوءة أو نصف مملوءة.


مثال 1 :




ليس له هذه البنية الالكترونية و إنما له البنية التالية:




مثال 2:




ليس له هذه البنية الإلكترونية وإنما له البنية التالية:



مثال 3:



ليس له هذه البنية الإلكترونية وإنما له البنية التالية:



➤ العناصر التي تملأ فيها تحت الطبقة 4f لها نفس الخواص الكيميائية لعنصر **Lanthane (La)** وتسمى

**اللوتانيدات (les lanthanides).**

➤ العناصر التي تملأ فيها تحت الطبقة 5f لها نفس الخواص الكيميائية لعنصر **Actinium (Ac)** وتسمى **الآكتينيدات**

**(les actinides).**

2. دراسة الأعمدة:

في الجدول الدوري 18 عمود و تجتمع هذه الأعمدة في أجنحة هي الجناح f, d, p, s.

I <sub>A</sub>	II <sub>A</sub>	III <sub>A</sub>	IV <sub>A</sub>	V <sub>A</sub>	VI <sub>A</sub>	VII <sub>A</sub>	O										
		III <sub>B</sub>	IV <sub>B</sub>	V <sub>B</sub>	VI <sub>B</sub>	VII <sub>B</sub>	VIII <sub>B</sub>	I <sub>B</sub>	II <sub>B</sub>								
القلويات ns <sup>1</sup>	القلويات الترابية ns <sup>2</sup>	العناصر الانتقالية ns <sup>2</sup> (n-1)d <sup>x</sup> 1 ≤ x ≤ 10								احماض Lewis	مجموعة الكربون	قواعد Lewis	مجموعة الأكسجين	مجموعة الهالوجينات	الغازات الخاملة		
		La	d الجناح								(ns <sup>2</sup> np <sup>x</sup> ) 1 ≤ x ≤ 6	p الجناح					
		Ac									f الجناح						
											Lanthanides (4f)						
											Actinides (5f)						


➤ القلوبات تفقد إلكترون بسهولة لتعطي البنية الإلكترونية للغاز الخامل.

➤ القلوبات الترابية تفقد إلكترونين بسهولة لتعطي البنية الإلكترونية للغاز الخامل.

➤ الشواذ في الجناح d هي - عناصر الفوج VI<sub>B</sub> : ns<sup>1</sup>(n-1)d<sup>5</sup>


- عناصر الفوج I<sub>B</sub> : ns<sup>1</sup>(n-1)d<sup>10</sup>.

➤ الفوج VIII<sub>B</sub> يشمل العناصر التالية :





يسمى هذا الفوج بفوج الثلاثية **les triades** نظرا لنتشابه الخواص الكيميائية لعناصر الاسطر و الاعمدة.

➤ احماض Lewis هي العناصر التي تحتوي على فجوة فارغة تستقبل زوج الكتروني.



حجيرة فارغة

➤ قواعد Lewis هي العناصر التي تحتوي على زوج الكتروني حر.



زوج الكتروني حر

➤ مجموعة الهالوجينات له قابلية اكتساب إلكترون لتصبح لها نفس البنية الالكترونية للغاز الخامل.

➤ الغازات الخاملة هي العناصر المستقرة.

### III. تعيين موقع عنصر كيميائي:

#### 1. تعيين الجناح و المجموعة لعنصر ما :

يمكننا تعيين الجناح الذي ينتمي إليه عنصر كيميائي من خلال التوزيع الالكتروني له حيث : تحت الطبقة التي تستقبل

الإلكترون الأخير في التوزيع الالكتروني هي التي تحدد الجناح s, d, p, f.

يمكننا تعيين المجموعة A أو B كما يلي :

- العنصر ينتمي إلى المجموعة A إذا كانت تحت الطبقة التي تستقبل الإلكترون الأخير في التوزيع الالكتروني هي p أو s.
- العنصر ينتمي إلى المجموعة B إذا كانت تحت الطبقة التي تستقبل الإلكترون الأخير في التوزيع الالكتروني هي f أو d.



تحت الطبقة p هي التي تستقبل الإلكترون الأخير إذن الأوكسجين ينتمي إلى الجناح p و المجموعة A.

## 2. تعيين الفوج و السطر و العمود :


✓ تعيين فوج عنصر ما يحدد بعدد الكترونات التكافؤ.



Mg يحتوي الكروني تكافؤ إذن هو ينتمي إلى الفوج II

تحت الطبقة s تستقبل الإلكترون الأخير إذن هو ينتمي إلى المجموعة A و الجناح s.

و منه عنصر Mg ينتمي إلى الفوج II<sub>A</sub>.





إذن عدد الكترونات التكافؤ 1 و الإلكترون الأخير يقع في تحت الطبقة d إذن المجموعة B و منه الفوج I<sub>B</sub>.

✓ تعيين السطر ( الدور ) يقابل اكبر عدد كمي رئيسي n في التوزيع الالكتروني.

✓ تعيين العمود يمثل مجموع عدد الالكترونات التي تأتي بعد الغاز الخامل.

مثال :



الدور 5 , الجناح d , المجموعة B , الفوج IV<sub>B</sub> , العمود 4 .

## IV. الخواص الذرية و الدورية :

### (1) طاقة التأين E<sub>i</sub>


طاقة التأين هي الطاقة اللازمة لنزع إلكترون من ذرة ما .



تتغير طاقة التأين في الجدول الدوري كما يلي :


- في السطر الواحد عدد الطبقات نفسه لكن Z يزداد ( عدد البروتونات يزداد ) أي أن قوى التجاذب بين النواة و الإلكترون الخارجي تزداد و منه **طاقة التأين تزداد**.

- في العمود الواحد عندما تزداد Z من الأعلى إلى الأسفل فان عدد الطبقات تزداد و بالتالي قوة التجاذب بين النواة و الإلكترون الخارجي تتناقص و منه **طاقة التأين تتناقص**.



### (2) نصف القطر الذري : $r_n$

- في السطر الواحد نصف القطر الذري يتناقص مع تزايد  $Z$  بفعل الشحنة.
- في العمود الواحد نصف القطر الذري يتزايد مع تزايد  $Z$  بفعل البعد.




### (3) الألفة الإلكترونية لعنصر A:

هي قابلية عنصر لاكتساب إلكترون أي هي الطاقة التي يحررها العنصر عندما يكتسب إلكترون.



- في السطر الواحد تتزايد الألفة الإلكترونية بتزايد  $Z$ .
- في العمود الواحد تتناقص الألفة الإلكترونية مع تزايد  $Z$ .





ملاحظة:

أعلى قيم للألفة الإلكترونية هي لفوج الهالوجينات VII<sub>A</sub> لأنها تقبل إلكترون بسهولة لكي يصبح لها نفس البنية الإلكترونية للغاز الخامل الذي يليها في الجدول الدوري.  
بالنسبة للعناصر المستقرة الألفة الإلكترونية معدومة.

### (4) الكهروسالبية X:

هي قدرة ذرة على جذب إلكترون ذرة أخرى إليها عندما تكون معها روابط كيميائية.



أكبر قيمة للكهروسالبية هي لعنصر الفلور F و تتغير كمايلي :

- في السطر الواحد تزداد الكهروسالبية مع زيادة  $Z$ .
- في العمود الواحد تنقص الكهروسالبية مع تزايد  $Z$ .

(5) الطبيعة المعدنية :

- ✓ المعدن هو عنصر له قابلية فقدان الكترولونات بسهولة ( مجموع الكترولونات تحت الطبقات s و p الأخيرة > 4 ) .
- ✓ الامعدن هو عنصر له قابلية اكتساب الكترولونات بسهولة ( مجموع الكترولونات تحت الطبقات s و p الأخيرة < 4 ) .

إذن فان الطبيعة المعدنية تتغير كما يلي

- في السطر الواحد تتناقص الطبيعة المعدنية مع زيادة Z .
- في العمود الواحد تتزايد الطبيعة المعدنية مع تزايد مع Z .

